



Edition
Grandes Cultures

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION CENTRE

BULLETIN TECHNIQUE N° 24

20 SEPTEMBRE 1990

COLZA : Les désherbants de post-levée page 2.
Des pucerons cendrés sur les colzas déjà levés.
Surveillez vos cuvettes, présence de quelques Altises.

- COLZA -

Les premiers colzas semés fin Août sont au stade "2 feuilles".

ALTISE :

Situation :

Quelques morsures sur cotylédons dans le Cher.

Préconisation :

Intervenir si 3 pieds de colza sur 10 portent des morsures (rares) jusqu'au stade "2 feuilles".

PUCERONS : Puceron cendré du chou et Puceron vert du pêcher

Situation :

Présence de pucerons cendrés dans le Cher (Pays Fort, Sancerrois) et en Eure et Loir (secteur de Voves).

Les pucerons, en conditions peu poussantes et sur jeunes plantules, provoquent un freinage de la croissance, des déformations et décolorations des feuilles. La transmission d'éventuels virus par le puceron vert du pêcher a été vérifiée mais en l'état actuel des recherches, leur nuisibilité semble faible ou nulle.

Les plantes peuvent héberger le virus sans symptômes visibles sans être affectées par le pathogène, d'autres plus atteintes peuvent présenter des symptômes de nanisme et d'avortements de siliques. Quelques cas ont été observés l'an dernier en région Centre (Cher, Loir et Cher), les parcelles présentaient peu de pieds atteints. Des analyses effectuées par l'INRA ont montré la présence de deux virus des crucifères (virus de la Mosaïque du chou-fleur et virus de la Mosaïque du navet).

Préconisation :

Ne connaissant pas encore l'incidence réelle de ces viroses sur la culture, la lutte consiste actuellement à réduire les dégâts directs des pucerons. Intervenez si 1 pied sur 5 est colonisé avec une spécialité homologuée (voir tableau page 3).

Attention au mélange insecticide + BUTISAN, risque de phytotoxicité.

Publication périodique

ABONNEMENT ANNUEL : 190 F

Ministère de l'Agriculture et de la Forêt
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
BP 210 - 93, rue de Curambourg
45403 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
Tél. 38.86.36.24



P46



HERBICIDES UTILISABLES EN POST-LEVÉE DES CULTURES DE COLZA

MATIERES ACTIVES	SPECIALITES COMMERCIALES (FIRMES)	DOSES/HA	OBSERVATIONS
carbétamide	LEGURAME PM (RHODIAGRI LITTORALE)	3 kg	- Depuis le stade 4 feuilles vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. - Application sur sol gelé - Essentiellement antigraminées.
		5 à 6 kg	- Contre chiendent de Novembre à fin Janvier.
propyzamide	KERB Flo (ROHM ET HAAS)	1,25 l	- A partir du stade 2 feuilles vraies du colza (B2) jusqu'à la reprise de végétation. - Application sur sol gelé - Essentiellement antigraminées.
propyzamide + diuron	KERB ULTRA (ROHM ET HAAS)	1,2 kg	- A partir du stade 4 feuilles bien développées, 6 ^e feuille naissante des colzas sains bien implantés. - De préférence avant l'hiver - Utiliser par temps humide, couvert, frais. - Antigraminées et action limitante sur Sanves, Ravenelles.
carbétamide + diméfurone	PRADONE TS (RHODIAGRI LITTORALE)	3,5 kg	- A partir stade 6 feuil. vraies (B6) des colzas sains et bien implantés. - Application possible sur sol gelé - Antidicotylédones et antigraminées.
diméfurone + clopyralid	CLERDONE (RHODIAGRI LITTORALE)	2,5 l	- Sur colza sain, bien enraciné (pivot > 10 cm), à partir stade 4 feuilles vraies du colza. - Antidicotylédones. - Ne pas utiliser en mélange avec un antigraminée à action foliaire, respecter 10 jours d'intervalle entre les traitements. - Mélange possible avec un antigraminée à action racinaire. - Programme de traitement : Capselle : BUTISAN 1,5 l post-semis, CLERDONE 2,5 l post-levée. Géranium : DEVRINOL 2,2 l post-semis, CLERDONE 2,5 l post-levée.
clopyralid	LONTREL SF 100 (SCHERING)	1,2 l	- De la levée du colza jusqu'au stade boutons floraux. - Spectre : composées et légumineuses. - Dose d'emploi : 0,75 l à 1,25 l avec 3 l d'huile Schering.

LES ANTIGRAMINEES A ACTION FOLIAIRE SUR COLZA : Ils s'utilisent quelque soit le stade du colza, à partir du stade 3 feuilles des graminées. La végétation doit être active et la température comprise entre 10 et 20° pour une pénétration et une systémie optimale de la matière active. Contre les graminées vivaces, il est nécessaire de doubler les doses. La dose d'huile est modulable en fonction des conditions climatiques.

MATIERES ACTIVES	SPECIALITES COMMERCIALES (FIRMES)	DOSES/HA	OBSERVATIONS
alloxydime- sodium	PERVIN (SCHERING)	1 kg + 3 l huile (SCHERING)	- Sur graminées annuelles.
		1 à 1,25 kg + 3 l huile (SCHERING)	- Sur graminées vivaces.
sethoxydime	PERVINAL (SCHERING)	2 l + 3 l huile (SCHERING)	- Sur graminées annuelles.
		3 l + 3 l huile (SCHERING)	- Sur graminées vivaces.
fluazifop- p-butyl	FUSILADE X2 + AGRAL (SOPRA)	0,75 l + 0,1 % AGRAL	- Sur graminées annuelles.
		1,5 l + 0,1 % AGRAL	- Sur graminées vivaces.
haloxyfop- éthoxyéthyl	GALLANT (DOW ELANCO)	1 l	- Application à l'automne uniquement. - Sur graminées annuelles.
		2 l	- Sur graminées vivaces et pâturins.
quizalofop-éthyl isomère D	TARGA D+ (PEPRO)	0,5 l + 2 l huile (SIPREN)	- Sur graminées annuelles.
		1,25 l + 2 l huile (SIPREN)	- Graminées vivaces stade 15-20 cm, pâturins 3 feuil. maximum, ray-grass après tallage.
cycloxydime	STRATOS (BASF)	1,25 l + 2 l huile 970	- Sur graminées annuelles.
		3 l + 2 l huile 970	- Sur graminées vivaces.
propaquizafop	AGIL (LA QUINOLEINE)	1,2 l	- Sur graminées annuelles.
		2 l	- Sur graminées vivaces.

LES PRODUITS DE TRAITEMENT A L'AUTOMNE SUR COLZA

• **Contre les limaces :**

- appâts empoisonnés sous forme granulée, épandre régulièrement le soir (25 granulés par m²)
- matières actives : mercaptodiméthur (3 kg/ha - Mesurol antilimaces)
métaldéhyde (5 à 10 kg/ha selon les spécialités commerciales)
thiodicarbe (5 kg/ha - Skipper)

• **Contre les insectes :**

Au semis *			De la levée à la fin du repos hivernal		Produits utilisables (1)		
Mouche du chou	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Matières actives	Spécialités commerciales	Puceron
	450 g ma/ha				Benfuracarbe	Oncol 5 G - Oncol S	
9 kg	9 kg	9 kg			Carbofuran	Nombreuses spécialités (2)	
9 kg	7,5 kg				Carbosulfan	Marshal Fort	
12 kg	12 kg	12 kg			Furathiocarbe	Deltanet	
10 kg	10 kg				Terbuphos	Counter plus	
	9 kg				Thiofanox	Dacamox 5 G - Dacamox 5 S	
9 kg	9 kg	9 kg			Carbofuran - Isophenphos	Carma	
	18 kg				Phorate + Terbuphos	Dispell	
			0,15 l	0,15 l	Alphaméthrine	Fastac	
			0,07 l		Bifenthrine	Talstar	
					Bromophos	Nexion 25 - Sovinexion 25 Nexion 40 - Nexion EC 40	2 l
			0,3 l	0,3 l	Cyfluthrine	Baythroid	
			0,25 l 25 g ma/ha		Cyperméthrine	Cymbush, Kafil super Nombreuses spécialités (2)	
			0,2 l	0,2 l	Deltaméthrine	Décis Décis Flo - Biram Flo	
					Dialiphos	Torak	
			250 g ma/ha		Endosulfan	Nombreuses spécialités (2)	
			0,6 l		Esfenvalérate	Sumi alfa	
			0,5 l		Fenvalérate	Sumicidin 10	
			0,2 l		Fluvalinate	Mavrik - Mavrik Flo	0,2 l
			0,1 l	0,15 l	Lambda-Cyhalothrine	Karate	
			200 g ma/ha		Lindane Lindane huileux	Nombreuses spécialités (2)	
			1,5 l ou 1,5 kg		Malathion	Nombreuses spécialités (2)	
			1,25 kg		Méthidathion	Ultracide 20 bouillie Ultracide 20 liquide	
			200 g ma/ha		Parathion Ethyl et Méthyl	Nombreuses spécialités (2)	
			200 g ma/ha		Parathion huileux	Nombreuses spécialités (2)	
					Phosalone	Zolone Flo - Azofène Flo Nombreuses spécialités (2)	1,2 l
					Pyrimicarbe	Pirimor G - Aphox	0,5 kg
			0,065 l		Tralométhrine	Tracker 108 EC	
			0,75 l		Endosulfan + Parathion Ethyl	Drifène AP - Ekadrine PE	
					Endosulfan + Thiométon	Serk EC	1,5 l
			0,75 l 0,75 l		Phosalone + Parathion Méthyl	Fortène Taxylone	

* Pour les dernières mises en place, nous déconseillons les traitements du sol sauf en cas de présence de mouche du chou.

(1) Doses en litre ou kilogramme de produit commercial par hectare.

(2) La dose de matière active par hectare mentionnée correspond à la dose de matière la plus fréquente. Avant toute utilisation, vérifier la dose de produit commercial autorisée sur l'étiquette.

Rappel : les applications foliaires à base de produits contenant du lindane font l'objet d'un retrait d'homologation (voir bulletin N° 21).

* * * * *

UNE DATE A RETENIR : DU 4 AU 6 DECEMBRE 1990 - AU PALAIS DES CONGRES DE VERSAILLES

**DEUXIEME CONFERENCE INTERNATIONALE
SUR LES RAVAGEURS EN AGRICULTURE**

Pour tous renseignements, adressez-vous à Mme MARCHAIS
ANPP - 6, boulevard de la Bastille - 75012 PARIS - Tél. 1.43.44.89.64

* * * * *

P 47